Solana®

rapool
Der Raps

ТОО «Рапуль Казахстан»
РК, 110000, г. Костанай, ул. Карбышева, 117, оф. 35-39
тел.: +7 (7142) 37-07-98, 37-07-96
www.rapool.kz

Solana®

Мы любим картофель!

Семенной картофель наивысшего качества

от немецкой компании Солана ГмбХ&Ко. КГ

ЭДИСОН

Среднеранний высокоурожайный сорт двойного назначения: столового и для производства картофеля фри. Сорт ЭДИСОН великолепно подходит для производства сухих картофельных продуктов, он не темнеет при жарке. В качестве картофеля столового назначения он относится к кулинарному типу В, преимущественно не разваривается. Для сорта характерны крупные, очень однородные овальные и продолговато-овальные клубни, которые сохраняют свои качества для жарки даже после длительного хранения. Сорт очень устойчив к парше, фитофторозу, ризоктониозу, железистой и черной пятнистости, а также к вирусу Y.

Растение

Группа спелости	*среднеранняя*
Дней от посадки	*105 – 115*
Дней от всходов	*85 – 90*
Тип роста	*промежуточный*
Форма роста	*полу-прямостоячая*
Окраска цветка	*красно-фиолетовая*
Развитие в начальной стадии	*быстрое*
Количество клубней, шт	*12-16*

Устойчивость

Парша обыкновенная	*высокая*
Фитофтороз	*высокая*
Ризоктониоз	*высокая*
Черная ножка	*высокая*
Засухоустойчивость	*высокая*
Повреждения	*высокая*
Черная пятнистость	*высокая*
Y-Вирус	*высокая*

Свойства клубней

Форма клубней	*овальная, удлиненно-овальная*
Цвет мякоти	*кремовый*
Глубина залегания глазков	*средняя, поверхностная*
Цвет кожуры	*желтая, сетчатая*

Урожайность и качество

Назначение	*Столовый картофель, производство чипсов*
Урожайность	*Высокая 50-65 т/га*
Лежкость при хранении	*хорошая*
Вкусовые качества	*отличные, кулинарный тип В*
Потемнение при варке	*незначительное*
Потемнение мякоти	*незначительное*
Крахмалистость	*средняя, 14%*

Вышеизложенная информация подготовлена на основе наших знаний и опыта, но т.к. картофель является природным продуктом, и выращивается при различных условиях, то мы не несем ответственности за конечный результат.

Семенной картофель наивысшего качества

Мы любим картофель!

Группа компаний «Солана» из Германии занимается селекцией современных сортов картофеля, а также его производством и распространением. Линейка нашей продукции способна удовлетворить любой запрос и вкусы клиента.

Помимо селекции и распространения, мы предлагаем качественную экспертную консультацию по селекции и выращиванию картофеля, а также организовываем международную доставку. Заручившись исследованиями, современными методами сортового поддержания и нашей тесной долгосрочной работой с селекционерами мы можем гарантировать высокие стандарты качества нашего семенного картофеля. Постоянный менеджмент качества – это неотъемлемая часть производства нашего семенного материала.

Головной офис группы компаний «Солана» расположен в Гамбурге, Германия, но она имеет множество филиалов в различных странах. Вопросами приобретения картофеля в Казахстане занимается фирма «Рапуль Казахстан».

ТОО «Рапуль Казахстан»,
г. Костанай. ул. Карбышева, 117, оф. 35-39,
тел.: +7 (7142) 37 07 98, +7 (7142) 37 07 96
www.rapool.kz



БЕЛЬМОНДА

Среднеранний, хорошо хранящийся, преимущественно не развариваемый столовый сорт премиум-класса с очень высоким выходом урожайности товарного картофеля и отличными вкусовыми качествами. Сорт обладает гладкой кожурой, желтым цветом клубней и мякоти, а также однородной фракцией. Отличная устойчивость против Ризоктониоза, Альтернарии, Фитофтороза и др. болезней, а также против вторичного роста.

Растение

Группа спелости	*среднеранняя*
Дней от посадки	*105 – 115*
Дней от всходов	*90 – 100*
Тип роста	*промежуточный*
Форма роста	*полу-прямостоячая*
Окраска цветка	*красно-фиолетовая*
Развитие в начальной стадии	*стремительное*
Количество клубней, шт	*16-14*

Устойчивость

Нематода	*Ro 1, Ro 4*
Рак картофеля	*Pathotyp 1*
Гниль ботвы, клубней	*высокая*
Парша	*средневысокая*
Ризоктониоз	*высокая*
Альтернария	*высокая*
Вторичный рост	*очень высокая*
Черная ножка	*высокая*
Ржавчина	*очень высокая*
Повреждения	*высокая*
Черная пятнистость	*высокая*
Y-Вирус	*низкая*
Y-ntn Вирус	*очень высокая*
Вирус скручивания листьев	*средняя*

Свойства клубней

Форма клубней	*кругло-овальная*
Цвет мякоти	*желтый*
Глубина залегания глазков	*поверхностная*
Цвет кожуры	*желтая*
Структура кожуры	*гладкая*
Способность к хранению	*очень высокая, хранится до июня*

Урожайность и качество

Назначение	*Столовый картофель*
Урожайность	*Высокая 50-60 т/га*
Доля крупных клубней	*средняя*
Доля мелких клубней	*незначительная*
Развариваемость	*преимущественно неразвариваемый*
Потемнение при варке	*незначительное*
Потемнение мякоти	*в сыром виде незначительное*
Крахмалистость	*средняя, 14%*

Вышеизложенная информация подготовлена на основе наших знаний и опыта, но т.к. картофель является природным продуктом, и выращивается при различных условиях, то мы не несем ответственности за конечный результат.



РОДРИГА

Ранний, преимущественно не развариваемый, столовый сорт с кожурой красного цвета. Наряду с высокой урожайностью, данный сорт имеет красивые, выровненные овальные товарные клубни с очень поверхностным залеганием глазков. Имеет превосходную устойчивость к заражению паршой, фитофторой, черной ножкой, ризоктонией, черными пятнами и ржавчиной, Y-вирусом, раком типа 1 и нематодами Ro 1,4.

Растение

Группа спелости	*ранняя*
Дней от посадки	*95-100*
Дней от всходов	*80-85*
Тип роста	*промежуточный тип*
Форма куста	*прямостоячая, полупрямостоячая*
Окраска цветка	*красно-фиолетовая*
Развитие на начальной стадии	*среднее*
Количество клубней, шт	*среднее, 15-17*
Продолжительность периода покоя	*средневысокая*
Хранение	*использовать до мая, июня (в охлажденном хранилище)*

Устойчивость

Нематода	*Ro 1,4*
Рак картофеля	*Pathotyp 1*
Гниль ботвы	*выше средней*
Гниль клубней	*высокая*
Парша	*высокая*
Ризоктониоз	*высокая*
Черная ножка	*высокая*
Ржавчина	*высокая*
Повреждения	*высокая*
Черная пятнистость	*очень высокая*
Y-Вирус	*высокая*
Y-ntn Вирус	*высокая*

Свойства клубней

Форма клубней	*овальная*
Окраска мякоти	*светло-желтая*
Глубина залегания глазков	*поверхностная*
Цвет кожуры	*красный*
Структура кожуры	*сетчатая*

Урожайность и качество

Назначение	*столовый картофель*
Урожайность,т/га	*высокая, 45-60*
Доля крупных клубней	*выше средней*
Доля мелких клубней	*низкая*
Развариваемость	*преимущественно не разваривающийся*
Потемнение при варке	*слабое*
Потемнение мякоти в сыром виде	*слабое*
Крахмалистость	*12,6%*

Вышеизложенная информация подготовлена на основе наших знаний и опыта, но т.к. картофель является природным продуктом, и выращивается при различных условиях, то мы не несем ответственности за конечный результат.



РЕД ЛЕДИ

Преимущественно неразвариваемый, краснокожурный, среднеранний сорт столового картофеля с отличными вкусовыми качествами и высокой урожайностью. Красивая форма клубней, быстрое формирование прочной кожуры и отличная засухоустойчивость относятся к основным отличительным признакам сорта. Кроме того, РЕД ЛЕДИ обладает высокой устойчивостью против фитофтороза, ржавчины, черной пятнистости, рака картофеля и нематоды.

Растение

Группа спелости	*среднеранняя-ранняя*
Дней от посадки	*95 – 100*
Дней от всходов	*80 – 85*
Тип роста	*промежуточный тип*
Форма роста	*прямостоячий/ полупрямостоячий*
Окраска цветка	*красно-фиолетовая*
Развитие в начальной стадии	*среднее стремительное*
Количество клубней	*среднее, 13-16*

Устойчивость

Нематода	*Ro 1*
Рак картофеля	*Pathotyp 1*
Гниль ботвы	*средневысокая*
Гниль клубней	*высокая*
Парша	*высокая*
Ризоктониоз	*высокая*
Черная ножка	*средневысокая*
Ржавчина	*высокая*
Повреждения	*средневысокая*
Черная пятнистость	*высокая*
Y-ntn Вирус	*высокая*
Y-Вирус	*средняя*
Вирус скручивания листьев	*средняя*

Свойства клубней

Форма клубней	*продолговато-овальная*
Цвет мякоти	*желтый*
Глубина залегания глазков	*поверхностная*
Цвет кожуры	*красный*
Структура кожуры	*слегка сетчатая*

Урожайность и качество

Назначение	*столовый картофель*
Урожайность, т/га	*50–60*
Доля крупных клубней	*средневысокая 30–40%*
Доля мелких клубней	*незначительная – 0%*
Развариваемость	*преимущественно неразвариваемый*
Потемнение при варке	*незначительное*
Потемнение мякоти	*незначительное в сыром виде*
Крахмалистость	*низкая – ср. (13-15%)*
Период покоя	*средний*

Товарный вид сохраняется до января-февраля при оч. холодных температурах

Вышеизложенная информация подготовлена на основе наших знаний и опыта, но т.к. картофель является природным продуктом, и выращивается при различных условиях, то мы не несем ответственности за конечный результат.

КАРУЗО

КАРУЗО - высокоурожайный, способный к ранней уборке и долгому хранению сорт картофеля для переработки, который отлично подходит для производства чипсов и сухого картофельного пюре. Сорт показывает отличную устойчивость против гнили клубней, вируса Y, ризоктонии, железистой пятнистости.

Растение

Группа спелости	*средне-ранний*
Дней от посадки	*95 – 100*
Дней от всходов	*80 – 90*
Тип роста	*промежуточный*
Форма роста	*прямостоячее широкораскидистое*
Окраска цветка	*белая*
Развитие в начальной стадии	*стремительное*
Количество клубней, шт	*Высокое, 18-22*
Период покоя	*среднедлительный*

Устойчивость

Нематода	*Ro 1, 4*
Гниль ботвы	*высокая*
Гниль клубней	*высокая*
Парша	*средневысокая*
Ризоктония	*высокая*
Черная ножка	*высокая*
Железистая пятнистость	*высокая*
Повреждения	*средневысокая*
Черная пятнистость	*средняя*
Y-Вирус	*высокая*

Свойства клубней

Форма клубней	*кругло-овальная*
Цвет мякоти	*светло-желтый*
Глубина залегания глазков	*средне-поверхностное*
Цвет кожуры	*желтый*
Структура кожуры	*рыхлая*

Урожайность и качество

Назначение	*Производство чипсов, сухого картофельного пюре*
Урожайность	*средняя 40-45 т/га*
Доля крупных клубней	*незначительная*
Доля мелких клубней	*высокая*
Потемнение мякоти в сыром виде	*слабое*
Крахмалистость	*19-20%*
Хранение товарный:	*макс. до начала марта*
семена:	*возможно до мая*

Вышеизложенная информация подготовлена на основе наших знаний и опыта, но т.к. картофель является природным продуктом, и выращивается при различных условиях, то мы не несем ответственности за конечный результат.



КОРОЛЕВА АННА

Ранний, преимущественно не развариваемый , гомогенный сорт столового картофеля с отличными свойствами кожуры. Дает возможность получить богатый урожай товарного картофеля фракции 35/60. Несмотря на ранее созревание, сорт отличается очень хорошей лёжкостью. Ко всему прочему, КОРОЛЕВА АННА устойчива к вирусам Y и Y-ntn, а также ризоктонии, черной пятнистости, парше обыкновенной и серебристой, железистой пятнистости, альтернарии. Сорт устойчив к раку картофеля типа 1 и картофельной нематоде Ro1, 4.

Растение

Группа спелости	*ранний*
Дней от посадки	*95 – 100*
Дней от всходов	*75 – 85*
Тип роста	*стеблевой*
Форма роста	*прямостоячее*
Окраска цветка	*белая*
Развитие в начальной стадии	*стремительное*
Количество клубней, шт	*Высокое, 10-14*
Период покоя	*Длительный*
товарный	*до апреля –мая*
семенной	*без ограничений*

Устойчивость

Нематода	*Ro 1, 4*
Рак картофеля	*Pathotyp 1*
Гниль ботвы	*средневысокая*
Гниль клубней	*высокая*
Парша	*высокая*
Ризоктония	*очень высокая*
Черная ножка	*очень высокая*
Железистая пятнистость	*высокая*
Повреждения	*высокая*
Черная пятнистость	*очень высокая*
Y-Вирус	*очень высокая*
Y-ntn Вирус	*очень высокая*

Свойства клубней

Форма клубней	*продолговато-овальная*
Цвет мякоти	*желтый*
Глубина залегания глазков	*очень поверхностное*
Цвет кожуры	*желтый*
Структура кожуры	*гладкая*

Урожайность и качество

Назначение	*Столовый картофель*
Урожайность	*очень высокая 50-60 т/га*
Доля крупных клубней	*незначительная*
Доля мелких клубней	*незначительная до очень маленькой*
Развариваемость	*преимущественно неразвариваемый*
Потемнение при варке	*слабое*
Потемнение мякоти в сыром виде	*слабое*
Крахмалистость	*13 -14%*

Вышеизложенная информация подготовлена на основе наших знаний и опыта, но т.к. картофель является природным продуктом, и выращивается при различных условиях, то мы не несем ответственности за конечный результат.

ОПАЛ

ОПАЛ - среднеранний сорт картофеля для переработки на чипсы и сухих порошковых продуктов. Отлично хранится даже при холодных температурах (4°С). Высокая устойчивость против фитофтороза, черной ножки, вируса Y и железистой пятнистости, а также против засухи.

Растение

Группа спелости	*среднеранняя*
Дней от посадки	*110-115*
Дней от всходов	*85-95*
Тип роста	*стеблевой*
Форма куста	*полупрямостоячая, широкораскидистая*
Окраска цветка	*красно-фиолетовая*
Развитие на начальной стадии	*среднебыстрое*
Количество клубней, шт	*средневысокое, 12-15*
Продолжительность периода покоя	*очень длительное*
Хранение	*9 месяцев, до мая*

Устойчивость

Нематода	*Ro 1,4*
Рак картофеля	*Pathotyp 1*
Гниль ботвы	*высокая*
Гниль клубней	*высокая*
Парша	*средняя*
Ризоктониоз	*средневысокая*
Черная ножка	*высокая*
Ржавчина	*высокая*
Повреждения	*средняя*
Черная пятнистость	*средневысокая*
Y-Вирус	*высокая*
Y-ntn Вирус	*высокая*

Свойства клубней

Форма клубней	*кругло-овальная*
Окраска мякоти	*светло-желтая*
Глубина залегания глазков	*средняя*
Цвет кожуры	*желтый*
Структура кожуры	*сетчатая*

Урожайность и качество

Назначение	*производство чипсов, сухого картофельного пюре*
Урожайность, т/га	*средневысокая, 45-50*
Доля крупных клубней	*средневысокая*
Доля мелких клубней	*низкая*
Потемнение мякоти в сыром виде	*слабое*
Крахмалистость	*17-18%*

Вышеизложенная информация подготовлена на основе наших знаний и опыта, но т.к. картофель является природным продуктом, и выращивается при различных условиях, то мы не несем ответственности за конечный результат.

ЛЮДМИЛА

Высокоурожайный сорт, имеет красивый цвет после жарки. Сорт отлично подходит для переработки, особенно, для производства продуктов сухой консистенции. Это единственный сорт раннего картофеля пригодный для длительного хранения при температуре 4°С. Обладает отличной устойчивостью к парше, черной ножке, ризоктонии и фитофторе, а также невосприимчив к ржавчине и черной пятнистости.

Растение

Группа спелости	*ранняя*
Дней от посадки	*90-100*
Дней от всходов	*80-85*
Тип роста	*стеблевой*
Форма куста	*прямостоячая - полупрямостоячая*
Окраска цветка	*белая*
Развитие на начальной стадии	*стремительное*
Количество клубней, шт	*среднее, 12*
Лежкость	*средневысокая, до апреля*

Устойчивость

Нематода	*Ro 1, 4*
Рак картофеля	*Pathotyp 1*
Гниль ботвы	*средневысокая*
Гниль клубней	*высокая*
Парша	*высокая*
Ризоктония	*средневысокая*
Черная ножка	*высокая*
Ржавчина	*средневысокая*
Повреждения	*высокая*
Черная пятнистость	*высокая*
Y-Вирус	*низкая*
Деформация клубней	*высокая*

Свойства клубней

Форма клубней	*продолговатая*
Окраска мякоти	*кремовая*
Глубина залегания глазков	*неглубокое*
Цвет кожуры	*желтый*
Структура кожуры	*шероховатая*

Урожайность и качество

Назначение	*картофель-фри, продукты сухой консистенции*
Урожайность, т/га	*средневысокая, 50*
Доля крупных клубней	*средневысокая, 40%*
Доля мелких клубней	*незначительная*
Потемнение при варке	*незначительное*
Потемнение мякоти в сыром виде	*незначительное*
Крахмалистость	*16-17%*

Вышеизложенная информация подготовлена на основе наших знаний и опыта, но т.к. картофель является природным продуктом, и выращивается при различных условиях, то мы не несем ответственности за конечный результат.



ЛАБЕЛЛА

Среднеранний, высокоурожайный сорт. Для Лабеллы характерно большое количество клубней и однородная фракция. Лёжкость хорошая. Развариваемость средняя. У неё ярко-красная кожура и желтый цвет мякоти с отличными вкусовыми качествами. Лабелла имеет отличную устойчивость к фитофторозу, парше обыкновенной, железистой пятнистости, а также к механическому повреждению и к повышенному температурному режиму. Сорт устойчив к раку картофеля типа 1 и картофельной нематоде Ro1,4.

Растение

Группа спелости	*ранняя*
Развитие в начальной стадии	*быстрое*
Тип роста	*листовой*
Форма роста	*полупрямостоячая*
Окраска цветка	*красно-фиолетовая*
Количество клубней, шт	*14*

Устойчивость

Гниль ботвы/листьев	*средняя*
Клубневая гниль	*выше средней*
Парша	*выше средней*
Дуплистость	*средняя*
Повреждения	*средняя*
Появление синей пятнистости	*высокая*
А-Вирус	*высокая*
Х-Вирус	*высокая*
Y-Вирус	*выше средней*
Вирус скручивания листьев	*высокая*

Свойства клубней

Форма клубней	*удлиненно-овальная*
Окраска мякоти	*желтая*
Глубина залегания глазков	*неглубокое*
Цвет кожуры	*красная*
Структура кожуры	*гладкая*

Урожайность и качество

Назначение	*Столовый картофель*
Лежкость	*очень хорошая*
Урожайность	*высокая*
Доля крупных клубней	*выше средней*
Доля мелких клубней	*низкая*
Развариваемость	*средняя*
Потемнение мякоти при варке	*слабое*
Содержание крахмала	*ниже среднего,12%*

Вышеизложенная информация подготовлена на основе наших знаний и опыта, но т.к. картофель является природным продуктом, и выращивается при различных условиях, то мы не несем ответственности за конечный результат.



ЛАПЕРЛА

Ультраранний столовый засухоустойчивый сорт с высокой урожайностью, имеет крупные гладкие клубни и светло-яркую окраску мякоти. Лаперла имеет высокую устойчивость к серебристой парше, обычному патотипу картофельного рака и картофельной нематоде Ro1,4. Растение высотой от низкого до среднего.

Растение

Группа спелости	*очень ранняя*
Дней всходов до уборки	*60-70*
Развитие в начальной стадии	*медленное*
Форма роста	*полупрямостоячее*
Окраска цветка	*светло-красно-фиолетовая*
Количество клубней, шт	*среднее, 15-18*

Устойчивость

Нематода	*Ro 1, 4*
Рак картофеля	*Pathotyp 1*
Гниль ботвы	*выше средней*
Гниль клубней	*выше средней*
Фитофтороз	*высокая*
Ризоктониоз	*высокая*
Y-вирус	*высокая*
Парша	*средняя*
Вирус скручивания листьев	*высокая*

Свойства клубней

Форма клубня	*Округло-овальная*
Цвет мякоти	*кремовая*
Глубина залегания глазков	*Поверхностная*
Цвет кожуры	*желый*
Структура кожуры	*гладкая*

Урожайность и качество

Назначение	*Столовый картофель*
Лежкость	*Хорошая*
Урожайность т/га	*40-50*
Содержание крахмала	*13-15%*

Вышеизложенная информация подготовлена на основе наших знаний и опыта, но т.к. картофель является природным продуктом, и выращивается при различных условиях, то мы не несем ответственности за конечный результат.



ЛИЛЛИ

Среднеранний, столовый картофель с очень высоким выходом товарного урожая и превосходными вкусовыми качествами. Сорт обладает красивой кожурой, привлекательной желтой окраской клубней и мякоти, а также выровненной фракцией. Стоит отметить его высокую устойчивость к ризоктониозу, серебристой парше, гнили клубней, дуплистости, альтернарии, механическим повреждениям, черной пятнистости, и, прежде всего, к ржавчине. При посадке следует выдерживать большие расстояния между клубнями, иначе возможен высокий выход мелких клубней.

Растение

Группа спелости	*среднеранняя (80-100 дней, возможно 75-95 дней)*
Тип роста	*промежуточный тип*
Форма роста	*прямостоячая*
Окраска цветка	*белая*
Развитие в начальной стадии	*среднее*
Количество клубней	*очень высокое*
Продолжительность периода покоя	*средневысокая*
Хранение товарный	*до апреля/мая*
семена	*до мая*

Устойчивость

Нематода	*Ro 1,4*
Рак картофеля	*Pathotyp 1*
Гниль ботвы	*средняя*
Гниль клубней	*высокая*
Ризоктония	*высокая*
Черная ножка	*высокая*
Ржавчина	*очень высокая*
Деформация клубней	*низкая*
Повреждения	*высокая*
Парша	*высокая*
Появление черных пятен	*очень высокая*
Y-Вирус	*средняя*
Y-ntn Вирус	*очень высокая*
Вирус скручивания листьев	*средняя*

Свойства клубней

Форма клубней	*округло-овальная*
Цвет мякоти	*желтая, темно-желтая*
Глубина залегания глазков	*неглубокое*
Цвет кожуры	*желтая*
Структура кожуры	*сетчатая*

Урожайность и качество

Назначение	*столовый картофель*
Урожайность, т/га	*высокая, 60-70*
Доля крупных клубней	*низкая*
Доля мелких клубней	*очень низкая*
Развариваемость	*слабая*
Потемнение при варке	*очень низкое*
Потемнение мякоти в сыром виде	*низкое*
Крахмалистость	*12-14%*

Вышеизложенная информация подготовлена на основе наших знаний и опыта, но т.к. картофель является природным продуктом, и выращивается при различных условиях, то мы не несем ответственности за конечный результат.